

服用の際には、よくお読みください。【使用上の注意】（相談すること）SJ.DY [PNEX01]
1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること。【成分・分量】本品1日量<60mL (30mL×2)>
中 オキシアミチン末…200mg、ビタミンB₁硝酸塩…20mg、ビタミンB₂リン酸エステル…15mg、
ビタミンB₆…50mg、ニコチン酸アミド…60mg、アスパラギン酸カリウム・
マグネシウム等量混合物…200mg 添加物：白糖、D-ソルビトール液、スクラロース、
アセスルファムカリウム、クエン酸水和物、酒石酸、メタリン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、
没食子酸プロピル、香料、エタノール、グリセリン、パニリン●本剤に配合されている
ビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。【効能】●次の諸症状の緩和：神経痛、
筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労●脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は
薬剤師に相談すること。」●次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、
病中病後の体力低下時【用法・用量】成人（15歳以上）1日2回、
1回1本（30mL）を服用する。●服用間隔は4時間以上おくこと。
●定められた用法・用量を守ること。●小児には服用させないこと。

【保管及び取扱い上の注意】（1）直射日光の当たらない、涼しい所に保管すること。
（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり、品質が変わる）。
（4）開封後はただちに服用すること。（5）使用期限をすぎた製品は服用しないこと。
【第3類医薬品】販売名：ピップ内服液EX 発売元 /
ピップ株式会社 大阪市中央区農人橋2-1-36 〒540-0011お客様相談室 ☎(06)6945-4427 土・日・祝日を除く 10:00~17:00
〈ピップ製品情報〉ホームページ www.pip-club.com 製造販売元 /
大同薬品工業株式会社 奈良県葛城市新村214-1 〒639-2121

副作用被害
救済制度 0120-149-931

製造番号

使用期限

瓶：ガラスキャップ：金属